

表3 本田初期及び初中期一発除草剤

	薬剤名	使用時期	使用量 (/10a)	処理条件	備考
初中期 一発剤	アップレZ 1キロ粒剤※	移植時	1kg	田植え同時散布機で 施用	使用時期を厳守する
		移植直後～ノビエ3葉期 (移植後30日まで)	1kg	湛水散布又は 無人ヘリ散布	
	アップレZ フロアブル※	移植後3日～ノビエ3葉期 (移植後30日まで)	500ml	原液湛水散布又は 水口施用	
	アップレZ ジャンボ※	移植後3日～ノビエ3葉期 (移植後30日まで)	小包装10個 (400g)	小包装のまま 投げ入れる	使用時期を厳守する 表層剥離多発ほ場は避ける
	シグナス 1キロ粒剤	移植時	1kg	田植え同時散布機で 施用	コウキヤガラに効果有り
		移植直後～ノビエ3葉期 (移植後30日まで)	1kg	湛水散布又は 無人航空機散布	
	シグナス フロアブル	移植後1日～ノビエ3葉期 (移植後30日まで)	500ml	原液湛水散布又は 無人航空機散布	
	シグナス ジャンボ	移植後1日～ノビエ3葉期 (移植後30日まで)	小包装10個 (300g)	小包装のまま 投げ入れる	コウキヤガラに効果有り 表層剥離多発ほ場は避ける
	トップガン GT 1キロ粒剤75	移植時	1kg	田植え同時散布機で 施用	
		移植直後～ノビエ3葉期 (移植後30日まで)	1kg	湛水散布	
トップガン フロアブル	移植時	500ml	田植え同時散布機で 施用		
	移植直後～ノビエ3葉期 (移植後30日まで)	500ml	原液湛水散布		
トップガン 250 グラム	移植直後～ノビエ2.5葉期 (移植後30日まで)	250g	湛水散布又は 無人ヘリ散布	表層剥離多発ほ場は避ける	
初期剤	クラール EW	移植後1日～ノビエ1.5葉期 (移植後30日まで)	500ml	原液湛水散布	
	クラール 1キロ粒剤	移植時	1kg	田植え同時散布機で 施用	
		移植直後～ノビエ1.5葉期 (移植後30日まで)	1kg	湛水散布又は 無人航空機散布	
バレージ粒剤	移植後3日～10日 (ノビエ1.5葉期まで)	3kg	湛水散布	漏生イネに効果有り	

※アップレZ(1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ)は、特裁・限定純情米で使用可能